



ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๒๐.๑๐.๘ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พ.ศ. ๒๕๖๘ เลขที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกรหัสโรค (ICD-10) สำหรับกลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการที่สามารถเข้ารับการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้านที่เป็นเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้เอกสารแนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๔ ให้เลขที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายจเด็จ ธรรมธัชอารี)

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รหัสโรค (ICD-10) สำหรับกลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการที่สามารถเข้ารับการดูแลแบบผู้ป่วยในบ้าน

กลุ่มโรค/กลุ่มอาการ	รหัสโรค (ICD-10)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
๑. โรคแผลกดทับ และพื้นที่กดทับ (decubitus ulcer and pressure area)	- L89.0 Stage I decubitus ulcer and pressure area - L89.1 Stage II decubitus ulcer and pressure area - L89.2 Stage III decubitus ulcer and pressure area - L89.3 Stage IV decubitus ulcer and pressure area	- ผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการแสดง ของการติดเชื้อในกระแสเลือด - มีการทำแผลโดยบุคลากรวิชาชีพหรือญาติ ที่ผ่านการสอนโดยบุคลากรวิชาชีพ และมีการประเมินโดยบุคลากรวิชาชีพ อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง
๒. โรคติดเชื้อในระบบ ทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection)	- N10 Acute tubulo-interstitial nephritis - N39.0 Urinary tract infection, site not specified	- ผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการแสดง ของการติดเชื้อในกระแสเลือด - ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะชนิดฉีด และมีความจำเป็นต้องได้รับการติดตาม สัญญาณชีพอย่างน้อยวันละ ๓ ครั้ง
๓. โรคปอดอักเสบ (pneumonia)	- J10.0 Influenza with pneumonia, other influenza virus identified - J11.0 Influenza with pneumonia, virus not identified - J12.0-J12.9 Viral pneumonia, not elsewhere classified - J13 Pneumonia due to Streptococcus pneumoniae - J14 Pneumonia due to Haemophilus influenzae - J15.0-J15.9 Bacterial pneumonia, not elsewhere classified - J16.0 Chlamydial pneumonia - J16.8 Pneumonia due to other specified infectious organisms - J17* Pneumonia in diseases classified elsewhere - J18.0 Bronchopneumonia, unspecified	- ผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการแสดง ของการติดเชื้อในกระแสเลือด - ผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น severe pneumonia ยกเว้นเป็นกรณี step down ภายหลังจากรักษาเฉียบพลันเรียบร้อยแล้ว - ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะชนิดฉีด หรือการรักษาด้วยออกซิเจน และมีความจำเป็นต้องได้รับการติดตาม สัญญาณชีพอย่างน้อยวันละ ๓ ครั้ง

กลุ่มโรค/กลุ่มอาการ	รหัสโรค (ICD-10)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
	<ul style="list-style-type: none"> - J18.1 Lobar pneumonia, unspecified - J18.2 Hypostatic pneumonia, unspecified - J18.8 Other pneumonia, organism unspecified - J18.9 Pneumonia, unspecified 	
<p>๔. โรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน (acute appendicitis) ภายหลังได้รับการผ่าตัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - K35.8 Acute appendicitis, other and unspecified 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยได้รับการประเมินความเสี่ยงก่อนการผ่าตัดโดยวิสัญญีแพทย์ตามแนวทางของ American Society of Anesthesiologists (ASA classification) ที่มีระดับ ASA 1-3 - ผู้ป่วยและญาติที่ร่วมดูแลภายหลังการผ่าตัดได้รับคำแนะนำในการดูแลหลังการผ่าตัดตั้งแต่ก่อนการผ่าตัดโดยทีมพยาบาล (ODS nurse manager) - ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดไส้ติ่งแบบเปิด (open appendectomy) หรือการผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง (laparoscopic appendectomy) ในโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับตามมาตรฐานกรมการแพทย์ - ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด
<p>๕. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19/COVID-19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - U07.1 COVID-19, virus identified - U07.2 COVID-19, virus not identified 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยโควิด 19 ที่วินิจฉัยใหม่ตามเกณฑ์การวินิจฉัย หรือเป็นผู้ป่วยโควิด 19 ที่ step down หลังเข้ารับการรักษาที่สถานที่รัฐจัดให้หรือในโรงพยาบาลอย่างน้อย ๗ วัน และแพทย์เห็นว่าสามารถดูแลผู้ป่วยในที่บ้านด้วยวิธี home isolation ได้ - ผู้ป่วยไม่อยู่ในภาวะปอดอักเสบรุนแรง เช่น หายใจเร็วกว่า ๒๕ ครั้งต่อนาที ในผู้ใหญ่ oxygen saturation น้อยกว่าร้อยละ ๙๔

กลุ่มโรค/กลุ่มอาการ	รหัสโรค (ICD-10)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
<p>๖. ความผิดปกติทางจิต และพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - F102 Alcohol, Dependence syndrome - F105 Alcohol, Psychotic disorder - F106 Alcohol, Amnesic syndrome - F107 Alcohol, Residual and late-onset psychotic disorder - F108 Alcohol, Other mental and behavioral disorders - F109 Alcohol, Unspecified Mental and behavioral disorder - F112 Opioids, Dependence syndrome - F115 Opioids, Psychotic disorder - F116 Opioids, Amnesic syndrome - F117 Opioids, Residual and late-onset psychotic disorder - F118 Opioids, Other mental and behavioral disorders - F119 Opioids, Unspecified Mental and behavioral disorder - F122 Cannabinoids, Dependence syndrome - F123 Cannabinoids, Withdrawal state - F125 Cannabinoids, Psychotic disorder - F126 Cannabinoids, Amnesic syndrome 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีการประเมินอาการถอนพิษแอลกอฮอล์อยู่ในระดับเล็กน้อย (CIWA 0-10 หรือ AWS 0-4) และประเมินอาการทางจิตเวชอยู่ในระดับปานกลางลงมา (CGI-S ≤ 4) - ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตจากการเสพยาหรืออนุพันธ์ของฝิ่น มีอาการถอนพิษเล็กน้อย (COWS 0-12) - ผู้ป่วยยังมีอาการทางจิตเวชหลงเหลืออยู่ แต่ไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง ผู้อื่น และทรัพย์สิน - ผู้ป่วยไม่มีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่ม SMI-V 1-4 - ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยประเมิน burden of care ได้ไม่เกิน ๖๑ คะแนน - ผู้ป่วยต้องไม่มีภาวะฉุกเฉินทางกาย และอาการโรคเรื้อรังทางกายสามารถควบคุมได้

กลุ่มโรค/กลุ่มอาการ	รหัสโรค (ICD-10)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
	<ul style="list-style-type: none"> - F127 Cannabinoids, Residual and late-onset psychotic disorder - F128 Cannabinoids, Other mental and behavioral disorders - F129 Cannabinoids, Unspecified Mental and behavioral disorder - F132 Sedatives or hypnotics, Dependence syndrome - F135 Sedatives or hypnotics, Psychotic disorder - F136 Sedatives or hypnotics, Amnesic syndrome - F137 Sedatives or hypnotics, Residual and late-onset psychotic disorder - F138 Sedatives or hypnotics, Other mental and behavioral disorders - F139 Sedatives or hypnotics, Unspecified Mental and behavioral disorder - F142 Cocaine, Dependence syndrome - F145 Cocaine, Psychotic disorder - F146 Cocaine, Amnesic syndrome - F147 Cocaine, Residual and late-onset psychotic disorder - F148 Cocaine, Other mental and behavioral disorders 	

กลุ่มโรค/กลุ่มอาการ	รหัสโรค (ICD-10)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
	<ul style="list-style-type: none">- F149 Cocaine, Unspecified Mental and behavioral disorder- F152 Other stimulants including caffeine, Dependence syndrome- F153 Other stimulants including caffeine, Withdrawal state- F155 Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder- F156 Other stimulants including caffeine, Amnesic syndrome- F157 Other stimulants including caffeine, Residual and late-onset psychotic disorder- F158 Other stimulants including caffeine, Other mental and behavioral disorders- F159 Other stimulants including caffeine, Unspecified Mental and behavioral disorder- F162 Hallucinogens, Dependence syndrome- F163 Hallucinogens, Withdrawal state- F165 Hallucinogens, Psychotic disorder- F166 Hallucinogens, Amnesic syndrome	

กลุ่มโรค/กลุ่มอาการ	รหัสโรค (ICD-10)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
	<ul style="list-style-type: none">- F167 Hallucinogens, Residual and late-onset psychotic disorder- F168 Hallucinogens, Other mental and behavioral disorders- F169 Hallucinogens, Unspecified Mental and behavioral disorder- F182 Volatile solvents, Dependence syndrome- F183 Volatile solvents, Withdrawal state- F185 Volatile solvents, Psychotic disorder- F186 Volatile solvents, Amnesic syndrome- F187 Volatile solvents, Residual and late-onset psychotic disorder- F188 Volatile solvents, Other mental and behavioral disorders- F189 Volatile solvents, Unspecified Mental and behavioral disorder- F192 Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence syndrome- F193 Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Withdrawal state	

กลุ่มโรค/กลุ่มอาการ	รหัสโรค (ICD-10)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
	<ul style="list-style-type: none"> - F195 Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder - F196 Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Amnesic syndrome - F197 Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Residual and late-onset psychotic disorder - F198 Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Other mental and behavioral disorders - F199 Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Unspecified Mental and behavioral disorder 	
<p>๗. โรคจิตเภท พฤติกรรม แบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - F200 Paranoid schizophrenia - F201 Hebephrenic schizophrenia - F202 Catatonic schizophrenia - F203 Undifferentiated schizophrenia - F204 Schizophrenia, Post-schizophrenic depression - F205 Residual schizophrenia - F206 Simple schizophrenia - F208 Other schizophrenia - F209 Schizophrenia, unspecified - F220 Delusional disorder 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยได้รับการประเมิน clinical global impression (CGI-S) มากกว่า ๔ คะแนน และระดับอาการทางจิต (BPRS) อยู่ระดับปานกลาง (๓๗-๘๙ คะแนน) หรือ the positive and negative syndrome scale (PANSS) อยู่ระดับปานกลาง (๗๕-๙๔ คะแนน) หรือ health of the nation outcome (HoNOS) อยู่ระดับปานกลาง - ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยประเมิน burden of care ได้ไม่เกิน ๖๑ คะแนน - ผู้ป่วยต้องไม่มีภาวะฉุกเฉินทางกาย และอาการโรคเรื้อรังทางกายสามารถควบคุมได้

กลุ่มโรค/กลุ่มอาการ	รหัสโรค (ICD-10)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
	<ul style="list-style-type: none"> - F228 Other persistent delusional disorders - F229 Persistent delusional disorder, unspecified - F250 Schizoaffective disorder, manic type - F251 Schizoaffective disorder, depressive type - F252 Schizoaffective disorder, mixed type - F258 Other schizoaffective disorders - F259 Schizoaffective disorder, unspecified - F28 Other nonorganic psychotic disorders - F29 Unspecified nonorganic psychosis 	
<p>๘. ความผิดปกติทางอารมณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - F310 Bipolar affective disorder, Current episode hypomanic - F311 Bipolar affective disorder, Current episode manic without psychotic symptoms - F312 Bipolar affective disorder, Current episode manic with psychotic symptoms - F313 Bipolar affective disorder, Current episode mild or moderate depression - F314 Bipolar affective disorder, Current episode severe depression, Without psychotic symptoms 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว หรือผู้ที่มีอาการเมเนีย จะต้องมึผลลการประเมิน MARDS ไม่เกิน ๑๒ คะแนน และ YMRS ไม่เกิน ๑๒ คะแนน - ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินความรุนแรงของอาการซึมเศร้าอยู่ในระดับน้อยหรือปานกลาง ($9Q \leq 18$) ไม่เกิน ๑๘ คะแนน และมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายต่ำ ($8Q \leq 8$) - ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยประเมิน burden of care ได้ไม่เกิน ๖๑ คะแนน - ผู้ป่วยต้องไม่มีภาวะฉุกเฉินทางกาย และอาการโรคเรื้อรังทางกายสามารถควบคุมได้

กลุ่มโรค/กลุ่มอาการ	รหัสโรค (ICD-10)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
	<ul style="list-style-type: none">- F315 Bipolar affective disorder, Current episode severe depression, With psychotic symptoms- F316 Bipolar affective disorder, Current episode mixed- F317 Bipolar affective disorder, Currently in remission- F318 Bipolar affective disorder, Other bipolar affective disorders- F319 Bipolar affective disorder, unspecified- F320 Mild depressive episode- F321 Moderate depressive episode- F322 Severe depressive episode without psychotic symptoms- F323 Severe depressive episode with psychotic symptoms- F328 Other depressive episodes- F329 Depressive episode, unspecified- F330 Recurrent depressive disorder, current episode mild- F331 Recurrent depressive disorder, current episode moderate- F332 Recurrent depressive disorder, current episode severe without psychotic symptoms	

กลุ่มโรค/กลุ่มอาการ	รหัสโรค (ICD-10)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
	<ul style="list-style-type: none"> - F333 Recurrent depressive disorder, current episode severe with psychotic symptoms - F334 Recurrent depressive disorder, currently in remission - F338 Other recurrent depressive disorders - F339 Recurrent depressive disorder, unspecified - F341 Dysthymia - F39 Unspecified mood [affective] disorder 	
<p>๘. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการกำเริบเฉียบพลัน (acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - J44.1 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified 	<p>- ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแล้วมีความรุนแรงระดับกลุ่มอาการปานกลาง* และตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นด้วยยาพ่นขยายหลอดลมแบบออกฤทธิ์สั้น (short-acting β_2-agonists และ/หรือ short-acting anticholinergics) และยาต้านการอักเสบสเตียรอยด์ (systemic corticosteroid) จนกระทั่งอาการคงที่ สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>*กลุ่มอาการปานกลาง ต้องเข้าเกณฑ์ ๓ ใน ๕ ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ค่าอาการหายใจลำบาก (Dyspnea visual analogue score; VAS) มากกว่าหรือเท่ากับ ๕ ๒. อัตราการหายใจมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๔ ครั้งต่อนาที ๓. อัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจร มากกว่าหรือเท่ากับ ๙๕ ครั้งต่อนาที ๔. ค่าออกซิเจนในเลือด (room air SpO2) น้อยกว่า ๙๒% และ/หรือเปลี่ยนแปลงมากกว่า ๓%

กลุ่มโรค/กลุ่มอาการ	รหัสโรค (ICD-10)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
		<p>๕. ระดับโปรตีน (C-reactive protein; CRP) มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลก่อนอย่างน้อย ๓ วันและส่งกลับไปรักษาที่บ้าน (early discharge/step down) - ผู้ป่วยไม่มีภาวะปอดอักเสบ - ผู้ป่วยไม่มีอาการของโรคร่วมที่รุนแรง เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ - ไม่มีประวัติอาการกำเริบรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจ - สามารถรับการรักษาด้วยออกซิเจน ยาขยายหลอดลม และวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วที่บ้านได้
<p>๑๐. ผู้ป่วยระยะกำลังเสียชีวิตที่บ้าน (active dying patients)</p>	<p>- Z51.5 Palliative care</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยที่มีอวัยวะสำคัญล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง* จนกระทั่งระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทส่วนกลาง หรือกล้ามเนื้อหยุดทำงาน โดยคาดการณ์ระยะเวลาหลังจากเริ่มต้นจนถึงเสียชีวิต ประมาณ ๑ สัปดาห์ *ผู้ป่วยต้องมีอาการทางคลินิก มากกว่า ๒ อาการขึ้นไป ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. อาการตัวเขียวบริเวณส่วนปลาย (Peripheral cyanosis) เช่น ผิวลาย (Mottling), เลือดไหลเวียนช้า และมีลายข้ำที่ผิวหนัง (stasis) ๒. การตอบสนองต่อการมองเห็นลดลง (Decreased response to visual stimuli) ๓. ร่องแก้มและมุมปากหย่อนตัว (Drooping of the nasolabial fold) ๔. การเหยียดคอมากกว่าปกติ (Hyperextension of neck) ๕. หายใจเร็วซ้ำหยุด (Cheyne-Stokes breathing) ๖. ม่านตาไม่ตอบสนอง (Non-reactive pupils) ๗. การตอบสนองด้วยคำพูดน้อยลง (Decreased response to verbal stimuli) ๘. เสียงหายใจครืดคราดในลำคอ (Death rattle)

กลุ่มโรค/กลุ่มอาการ	รหัสโรค (ICD-10)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
		<p>๙. การหายใจโดยมีการเคลื่อนไหวของกรามล่าง (Respiration with mandibular movement)</p> <p>๑๐. ปัสสาวะน้อยลง (Decreased urine output)</p> <p>๑๑. คลำชีพจรที่ข้อมือไม่ได้ (Pulselessness of radial artery)</p> <p>๑๒. หลับตาไม่ได้ (Inability to close eyelids)</p> <p>๑๓. การมีเสียงในคอ (Grunting of vocal cords)</p> <p>๑๔. กลืนไม่ได้ (Unable to take oral fluids)</p> <p>- ผู้ป่วยมีค่าคะแนนแบบประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลประคับประคอง (Palliative Performance Score; PPS) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓๐</p>
<p>๑๑. ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินประเภทผื่นหนาเฉพาะที่ (Psoriasis Vulgaris)</p>	<p>- L40.0 Psoriasis vulgaris</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพในเกณฑ์ปกติ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ผิวหนัง - ผู้ป่วยมีผื่นสะเก็ดเงิน ๑๐-๓๐% ของขนาดพื้นที่ผิวร่างกายทั้งหมด (BSA) และไม่มีผื่นกำเริบที่ใบหน้าหรืออวัยวะเพศ - ผู้ป่วยต้องได้รับการติดตามสัญญาณชีพอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง - มีโรคร่วมอื่น ๆ ที่สามารถควบคุมได้
<p>๑๒. ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม หลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบผ่าตัดวันเดียวกลับ ด้วยโปรแกรมการดูแลตนเองที่บ้าน (One day surgery in breast cancer patients with home recovery program; ODS BHR program)</p>	<p>- C50.0-C50.9 Malignant neoplasm of breast</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบไม่ซับซ้อน เช่น การผ่าตัดแบบสงวนเต้า การผ่าตัดเต้านมทั้งหมด ในโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับตามมาตรฐานกรมการแพทย์ - ผู้ป่วยมีอายุน้อยกว่า ๗๐ ปี และมีคะแนน Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 0-1 - ผู้ป่วยได้รับการประเมินความเสี่ยงก่อนการผ่าตัดโดยวิสัญญีแพทย์ตามแนวทางของ American Society of Anesthesiologists (ASA classification) ที่มีระดับ ASA 1-3 และสามารถควบคุมโรคประจำตัวได้ดี

กลุ่มโรค/กลุ่มอาการ	รหัสโรค (ICD-10)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
		<ul style="list-style-type: none">- ผู้ป่วยมีดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 35 kg/m²- ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต- ไม่มีประวัติการใช้สารเสพติดหรือยาทางจิตเวช- ไม่มีประวัติแพ้ยาที่ใช้ระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัด- มีญาติหรือผู้ดูแลในวันรับการผ่าตัดและหลังผ่าตัด